




RATICIDES

MATIÈRES ACTIVES: HISTORIQUE/ EFFICACITÉ



Nom Commercial	Formulation et composition	Emballage	Observation
GENERATION BLE'TECH	Formulation Grains, à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE 0,0025%	Sachet de 25 g en carton de 14 Kg	Raticide foudroyant pour l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics.
GENERATION PAT	Formulation Pâte à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE 0,0025%	Carton de 15 Kg	Raticide foudroyant pour l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics.
GENERATION BLOCK	Formulation Bloc à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE 0,0025%	Seau de 7 Kg	Raticide foudroyant pour l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics.
COUMAFEN PELLET	Raticide à base de : Flocoumafen 0.005 %	Seau de 10 Kg	Son efficacité est immédiate car COUMAFEN est conçu d'une formule attractive pour les rats et matière active dernière génération
COUMAFEN BLOCK	Raticide bloc 20g à base de : Flocoumafen 0.005 %	Fut de 25 Kg	Son efficacité est immédiate car COUMAFEN est conçu d'une formule attractive pour les rats et matière active dernière génération
ZAGOR PATE FRAICHE	Raticide appât frais à base de : Brodifacoum 0,005 %	Seau de 10 Kg	Formulée en pâte très riche et appétente. Indupharma fabrique une pâte spéciale contenant : farine, huile, vanille, chocolat, fromage et fenouil.
FACORAT PELLET	Raticide pellet à base de : Brodifacoum 0,005 %	Sac de 25 Kg	Raticide Classique largement utilisé. Donne de très bons résultats.
ZAGOR BLOC	Raticide bloc 20g à base de : Brodifacoum 0.005%	Carton de 10 Kg	Blocs hydrofuges obtenus mélangeant : farine, sucre, huiles, protéines, graines de céréales, conservateurs et de la paraffine.
MEGALON BLOC	Raticide bloc 3 et 20 g à base de : Bromadiolone 0,005 %	Carton de 10 Kg	Le bloc de 3 g pour le traitement des surfaces humides. Le bloc de 20 g pour être suspendu dans les égouts et boîte d'appâtage
RODEXION PELLET	Raticide pellet à base de : Bromadiolone 0,005 %	Sac de 25 Kg	Très intéressant pour l'alternance.
NOCURAT PATE FRAICHE	Raticide pâte fraîche à base de : Difenacoum 0,005 %	Seau de 10 Kg	Appétant pour les rats et souris Faible toxicité pour les chiens et chats Indupharma fabrique une pâte spéciale contenant : farine, huile, vanille, chocolat, fromage et fenouil
RODIMUR PELLET	Raticide pellet à base de : Difenacoum 0,005 %	Seau de 10 Kg	Efficace contre rats et souris, présente une faible toxicité pour les chiens et chats
STUNT	Raticide en poudre à base de : Coumatetralyl 0.75%	Seau de 10 Kg	Rodenticide anticoagulant pour les rats et souris.

GENERATION BLE'TECH

RATICIDE A BASE DE
DIFETHIALONE



MADE IN FRANCE



Composition :

DIFETHIALONE : 0.0025 %
Matières attractives : jusqu'à 100 %

Caractéristiques :

Formulation Grains, à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE. A utiliser sur Rats (rats noirs et surmulots) et souris, à l'intérieur et autour (à proximité immédiate) des bâtiments privés, publics et agricoles.

Conditions d'utilisation : recommandé en cas de forte infestation et /ou la compétition alimentaire est de type céréale

L'action du produit est observable dans les 4 à 21 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent.

Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Mode d'emploi :

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés.

Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthode de lutte chimique, physique et des mesures d'hygiène. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Vérifier l'efficacité du produit sur le site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Prévenir les responsables de la mise en marché en cas de non efficacité du traitement.

Disposer les appâts dans les postes d'appâtage conformément au mode d'emploi ci-dessus. Ne pas nettoyer les postes entre deux applications et les disposer au plus près des traces des rongeurs, sur les lieux de passage identifiés (le long des murs, crottes, nids, passages, coulées et des trous formés par les rongeurs) de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux non cibles ou par les enfants.

Placer les postes d'appâtage en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. Ne pas disposer sur des surfaces ou des ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le nombre de postes d'appâtage est en fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Respecter les intervalles d'application de l'appât.

A noter : La souris étant sédentaire, elle a un rayon d'action dans les 10 mètres autour du point de nidification, il est donc recommandé de multiplier les postes d'appâtage dans cette zone.

Fréquence de passage recommandée :

Inspection et réapprovisionnement des postes d'appâtage :

Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement. Récupérer les rongeurs retrouvés morts durant le traitement, par souci d'hygiène et afin d'éviter qu'ils soient consommés par d'autres animaux.

GENERATION PAT

RATICIDE A BASE DE
DIFETHIALONE

LIPHA TECH
— GROUPE DE SANGOSSE

MADE IN FRANCE

Composition :

DIFETHIALONE : 0.0025 %
Matières attractives : jusqu'à 100 %

Caractéristiques :

Formulation Pâte à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE. A utiliser sur Rats (rats noirs et surmulots) et souris, à l'intérieur et autour (à proximité immédiate) des bâtiments privés, publics et agricoles.

Conditions d'utilisation : recommandé en cas de forte infestation et /ou la compétition alimentaire est de type céréale

L'action du produit est observable dans les 4 à 21 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent.

Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Mode d'emploi :

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés.

Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthode de lutte chimique, physique et des mesures d'hygiène. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Vérifier l'efficacité du produit sur le site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Prévenir les responsables de la mise en marché en cas de non efficacité du traitement.

Disposer les appâts dans les postes d'appâtage conformément au mode d'emploi ci-dessus. Ne pas nettoyer les postes entre deux applications et les disposer au plus près des traces des rongeurs, sur les lieux de passage identifiés (le long des murs, crottes, nids, passages, coulées et des trous formés par les rongeurs) de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux non cibles ou par les enfants.

Placer les postes d'appâtage en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. Ne pas disposer sur des surfaces ou des ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Respecter les intervalles d'application de l'appât.

A noter : La souris étant sédentaire, elle a un rayon d'action dans les 10 mètres autour du point de nidification, il est donc recommandé de multiplier les postes d'appâtage dans cette zone.

Fréquence de passage recommandée :

Inspection et réapprovisionnement des postes d'appâtage :

Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement. Récupérer les rongeurs retrouvés morts durant le traitement, par souci d'hygiène et afin d'éviter qu'ils soient consommés par d'autres animaux.

GENERATION BLOCK

RATICIDE A BASE DE
DIFETHIALONE



MADE IN FRANCE



Composition :

DIFETHIALONE : 0.0025 %
Matières attractives : jusqu'à 100 %

Caractéristiques :

Formulation Bloc à base d'un anticoagulant de dernière génération : la DIFETHIALONE. A utiliser sur Rats (rats noirs et surmulots) et souris, à l'intérieur et autour (à proximité immédiate) des bâtiments privés, publics et agricoles.

Conditions d'utilisation : recommandé en cas de forte infestation et /ou la compétition alimentaire est de type céréale

L'action du produit est observable dans les 4 à 21 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent.

Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Mode d'emploi :

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés.

Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthode de lutte chimique, physique et des mesures d'hygiène. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Vérifier l'efficacité du produit sur le site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Prévenir les responsables de la mise en marché en cas de non efficacité du traitement.

Disposer les appâts dans les postes d'appâtage conformément au mode d'emploi ci-dessus. Ne pas nettoyer les postes entre deux applications et les disposer au plus près des traces des rongeurs, sur les lieux de passage identifiés (le long des murs, crottes, nids, passages, coulées et des trous formés par les rongeurs) de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux non cibles ou par les enfants.

Placer les postes d'appâtage en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. Ne pas disposer sur des surfaces ou des ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le nombre de postes d'appâtage est en fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Respecter les intervalles d'application de l'appât.

A noter : La souris étant sédentaire, elle a un rayon d'action dans les 10 mètres autour du point de nidification, il est donc recommandé de multiplier les postes d'appâtage dans cette zone.

Fréquence de passage recommandée :

Inspection et réapprovisionnement des postes d'appâtage :

Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement. Récupérer les rongeurs retrouvés morts durant le traitement, par souci d'hygiène et afin d'éviter qu'ils soient consommés par d'autres animaux.

COUMAFEN PELLET

Raticide à base de Flocoumafen



**KUKBO SCIENCE
CO., LTD.**

MADE IN SOUTH KOREA



Formulation :

Flocoumafen 0.005 %

Utilisation :

Rodenticide économique du fait qu'il abolit les rongeurs en utilisant une faible quantité de COUMAFEN.

Son efficacité est immédiate car COUMAFEN est conçu d'une formule attractive des rats.

Il contient Flocoumafen qui est un excellent actif pour une utilisation directe.

Organismes cibles :

Rats et souris

Stabilité et conditions de stockage :

A conserver dans l'emballage d'origine à la température ambiante.

Mode et doses d'application :

Comme les rats sont sensibles à l'odeur humaine, il faut porter des gants à l'utilisation.

Placer le produit là où les rats sont fréquents.

Mettre plus de produit si on remarque que la quantité initiale a diminué ou si l'endroit contient beaucoup de rats.

Les rats mangent ce produit après 2-3 jours d'application car ils sont très méfiants, donc il faut éviter de déplacer le produit appliqué initialement.

Précautions :

Ne pas laisser à la portée des enfants, les animaux domestiques et le bétail

Après utilisation, bien laver les mains et la peau en contact avec le raticide avec de l'eau et du savon.

Informations de sécurité :

En cas d'ingestion de raticides, dans la mesure du possible, prendre l'emballage du produit pour le montrer au médecin.

Premiers soins : en cas d'intoxication légère, administrer de la vitamine K1 selon les instructions du médecin.

Antidote : Vitamine K1

Demander un avis médical urgent ou consulter le médecin immédiatement.

COUMAFEN BLOC

Raticide bloc à base de
Flocoumafen



**KUKBO SCIENCE
CO., LTD.**

MADE IN SOUTH KOREA



Formulation :

Flocoumafen 0.005 %

Utilisation :

Rodenticide économique du fait qu'il abolit les rongeurs en utilisant une faible quantité de COUMAFEN.

Son efficacité est immédiate car COUMAFEN est conçu d'une formule attractive des rats.

Il contient Flocoumafen qui est un excellent actif pour une utilisation directe.

Organismes cibles :

Rats et souris

Stabilité et conditions de stockage :

A conserver dans l'emballage d'origine à la température ambiante.

Mode et doses d'application :

Comme les rats sont sensibles à l'odeur humaine, il faut porter des gants à l'utilisation.

Placer le produit là où les rats sont fréquents.

Mettre plus de produit si on remarque que la quantité initiale a diminué ou si l'endroit contient beaucoup de rats.

Les rats mangent ce produit après 2-3 jours d'application car ils sont très méfiants, donc il faut éviter de déplacer le produit appliqué initialement.

Précautions :

Ne pas laisser à la portée des enfants, les animaux domestiques et le bétail

Après utilisation, bien laver les mains et la peau en contact avec le raticide avec de l'eau et du savon.

Informations de sécurité :

En cas d'ingestion de raticides, dans la mesure du possible, prendre l'emballage du produit pour le montrer au médecin.

Premiers soins : en cas d'intoxication légère, administrer de la vitamine K1 selon les instructions du médecin.

Antidote : Vitamine K1

Demander un avis médical urgent ou consulter le médecin immédiatement.

ZAGOR PÂTE FRAICHE

Rodenticide prêt à l'emploi en pâte
à base de brodifacoum



MADE IN ITALY



Composition :

Brodifacoum pure	:	0.005 %
Dénatonium Benzoate	:	0.001 %
Substances d'appétence et coformulants	:	jusqu'à 100 %

Formulation :

Dans le ZAGOR PATE la matière active brodifacoum est formulée en appâts de pâte fraîche (avec un poids d'environ 20 grammes) obtenus mélangeant des farines, du sucre, des huiles végétales, des protéines et des conservateurs. Le dénatonium benzoate est ajouté à la formulation pour rendre le produit extrêmement amer et donc éviter l'ingestion de la part des enfants ; la concentration du dénatonium benzoate dans le produit, par contre, est telle que sa présence n'est pas perçue par les rongeurs ciblés.

La formulation en pâte fraîche est extrêmement appétante pour les rongeurs car il s'agit d'un aliment équilibré contenant toutes les substances alimentaires nécessaires pour leurs croissance (hydrates de carbone, protéines, graisses), par conséquent le ZAGOR PATE est indiqué pour le contrôle des rongeurs dans des environnements variés même en présence de sources d'aliments en concurrence.

Originalité :

La pâte fraîche fabriquée par INDIA est très attractive contient : farine, huile, vanille, chocolat, fromage, fenouil avec des conservateurs. Pour éviter l'ingestion accidentelle chez les enfants, cette pâte contient un amérisant.

Espèces qui peuvent être contrôlées :

ZAGOR PATE est accepté par tous les rongeurs nuisibles normalement présents dans nos environnements : le rat gris (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le souris (*Mus musculus*)

Caractéristiques :

Le brodifacoum est le plus récent des anticoagulants indirects. Sa particularité est la haute toxicité aiguë vers les animaux ciblés. Cette efficacité permet de tuer les rongeurs même après une seule ingestion

d'une petite quantité d'appât. En plus le brodifacoum est efficace même vers les rongeurs qui sont devenus résistants aux autres anticoagulants.

Les données comparatives de toxicité aiguë vers le souris montrent comme le brodifacoum est 2 fois plus efficace que le difénacoum, 3 fois plus que le diféthialone et 4 fois plus que le bromadiolone.

Taux et indications d'emploi :

Ne pas manipuler le produit aux mains nues. Porter des gants adéquats. Placer les appâts dans des postes d'appâtage de sécurité pour protéger les appâts, pour éviter que les animaux non ciblés les avalent et pour éviter la libération des appâts dans l'environnement. Placer les postes d'appâtage tout près des repaires, le long des pistes et là où on a observé la présence de rongeurs. Les postes d'appâtage doivent être placés à 5-10 mètre de distance entre eux. Les taux d'emploi recommandés sont : Souris (40 grammes d'appât tous les 100 mètres carrés); Rat gris (60-100 grammes d'appâts tous les 100 mètres carrés); Rat noir (60-100 grammes d'appâts tous les 100 mètres carrés).

Il faut signaler la zone traitée et prévenir sur le risque d'empoisonnement et les mesures de premier secours. Remplacer les postes d'appâtage chaque semaine, si nécessaire. Enlever les rongeurs morts tous les jours et les éliminer selon les normes en vigueur. Le produit n'est pas destiné à l'appâtage permanent. Organiser des traitements de la durée de 6 semaines maximum. A la fin du traitement, éliminer les postes d'appâtage selon les normes en vigueur.

Précautions d'emploi :

Les postes d'appâtage doivent être placés en sécurité afin de réduire au maximum le risque d'intrusion et l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des animaux non ciblés. S'assurer que les postes d'appâtage soient correctement accrochés et que les appâts ne puissent pas être traînés par les rongeurs. Pour l'utilisation correcte de ce produit, suivre les indications sur l'étiquette. Lire et garder la FDS. Ne pas contaminer les personnes, les animaux, les denrées alimentaire, y compris celles pour animaux, les boissons et leurs récipients avec le produit.

Antidote : Vitamine K1

FACORAT PELLET

Rodenticide à base de brodifacoum



INDUPHARMA

MADE IN ITALY



Composition :

Brodifacoum : 0.005 %
Dénatorium benzoate : 0.001 %
Substances appétantes : jusqu'à 100 %

Propriétés du produit :

Le FACORAT pellet est un appât rodenticide contenant 0.005 % de Brodifacoum, qui appartient à la deuxième génération des substances anticoagulantes indirectes et qui est très efficace. La matière active est répartie dans toute la masse du pellet.

L'agent amérissant confère une sécurité envers les enfants.

L'ingestion d'une seule dose de Facorat pellet est suffisante à causer la mort du rongeur en peu de jours. Les rongeurs meurent sans souffrance et, donc, sans éveiller les soupçons de leurs semblables; après l'ingestion, les rongeurs se sentent progressivement pris d'un sens d'étouffement. Ils vont donc chercher l'air et vont mourir à l'extérieur.

Toxicité de la matière active :

DL50 aiguë orale rat mâle : 0.27 mg/ kg
DL50 aiguë orale souris mâle : 0.40 mg/ kg
DL50 aiguë orale cobaye : 2.80 mg/ kg
DL50 aiguë orale poulet : 4.50 mg/ kg
DL50 aiguë orale chat : 25.0 mg/ kg

Technique d'application et dosage :

Les appâts de FACORAT pellets doivent être placés (20 à 40 g) dans les lieux envahis par les rongeurs, le long de leurs pistes, le long des murs, dans les coins etc. Il faut vérifier les appâts tous les 2 – 3 jours et les renouveler en cas de consommation.

Précautions de manipulation et stockage :

Ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux. Ne pas contaminer les aliments, les boissons et leurs récipients avec le produit. Utiliser des gants pendant l'application du produit. Après les traitements, détruire les appâts ou les garder dans un lieu sûr. Après la manipulation et en cas de contamination, se laver soigneusement à l'eau savonneuse.

Antidote : Vitamine K

RATICIDES

INSECTICIDES / LARVICIDES

PRODUITS D'HYGIÈNE
ET DÉSINFECTANTS

MATÉRIELS ET MOYENS DE CONTRÔLE

MATÉRIEL DE LUTTE
CONTRE LES CHIENS ERRANTS

ZAGOR BLOCS

Rodenticide prêt à l'emploi en bloc
à base de brodifacoum



MADE IN ITALY



Composition :

Brodifacoum pure	:	0.005 %
Dénatonium Benzoate	:	0.001 %
Substances d'appétence et coformulants	:	jusqu'à 100 %

Formulation :

Dans le ZAGOR BLOCS la matière active brodifacoum est formulée en blocs hydrofuges (avec un poids d'environ 20 grammes) obtenus mélangeant des farines, du sucre, des huiles végétales, des protéines, des graines de céréales, des conservateurs et de la paraffine.

Le dénatonium benzoate est ajouté à la formulation pour rendre le produit extrêmement amer et donc éviter l'ingestion de la part des enfants; la concentration du dénatonium benzoate dans le produit; par contre, est telle que sa présence n'est pas perçue par les rongeurs ciblés.

Les blocs sont perforés et ça permet de les accrocher dans les postes d'appâtage; les bords des blocs sont gravés pour faciliter la morsure des rongeurs.

Originalité :

Les blocs hydrofuges fabriquée par INDUPHARMA est très attractive contient : farine, huiles, protéines, graines de céréales, conservateurs et de la paraffine. Pour éviter l'ingestion accidentelle chez les enfants, les blocs contiennent un amérisant.

Espèces qui peuvent être contrôlées :

ZAGOR BLOCS est accepté par tous les rongeurs nuisibles normalement présents dans nos environnements : le rat gris (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le souris (*Mus musculus*)

Caractéristiques :

Le brodifacoum est le plus récent des anticoagulants indirects. Sa particularité est la haute toxicité aiguë vers les animaux ciblés. Cette efficacité permet de tuer les rongeurs même après une seule ingestion

d'une petite quantité d'appât. En plus le brodifacoum est efficace même vers les rongeurs qui sont devenus résistants aux autres anticoagulants.

Les données comparatives de toxicité aiguë vers les souris montrent comme le brodifacoum est 2 fois plus efficace que le difénacoum, 3 fois plus que le diféthialone et 4 fois plus que le bromadiolone.

Taux et indications d'emploi :

Ne pas manipuler le produit aux mains nues. Porter des gants adéquats. Placer les appâts dans des postes d'appâtage de sécurité pour protéger les appâts, pour éviter que les animaux non ciblés les avalent et pour éviter la libération des appâts dans l'environnement. Placer les postes d'appâtage tout près des repaires, le long des pistes et là où on a observé la présence de rongeurs. Les postes d'appâtage doivent être placés à 5-10 mètre de distance entre eux.

Le taux d'emploi recommandé est de 20 - 40 grammes de blocs.

Précautions d'emploi :

Les postes d'appâtage doivent être placés en sécurité afin de réduire au maximum le risque d'intrusion et l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des animaux non ciblés. S'assurer que les postes d'appâtage soient correctement accrochés et que les appâts ne puissent pas être traînés par les rongeurs. Pour l'utilisation correcte de ce produit, suivre les indications sur l'étiquette. Lire et garder la FDS. Ne pas contaminer les personnes, les animaux, les denrées alimentaires, y compris celles pour animaux, les boissons et leurs récipients avec le produit.

Antidote : Vitamine K1

MEGALON BLOC

Rodenticide prêt à l'emploi en blocs hydrofuges à base de bromadiolone



MADE IN ITALY



Composition :

Bromadiolone pure	: 0.005 %
Dénatonium Benzoate	: 0.001 %
Substances d'appétence et coformulants	: jusqu'à 100 %

Formulation :

Dans le MEGALON BLOCS la matière active bromadiolone est formulée en blocs hydrofuges (avec un poids d'environ 20 grammes) obtenus mélangeant des farines, du sucre, des huiles végétales, des protéines, des graines de céréales, des conservateurs et de la paraffine. La présence de la paraffine rend le produit résistant à l'humidité et au contact temporaire avec l'eau. Le produit, par conséquent, est particulièrement indiqué pour l'emploi dans des domaines où les autres types d'appâts rodenticides peuvent moisir et perdre leurs efficacité rapidement : sous-sols, locaux fréquemment lavés, fosses septiques, canalisations etc.

Le dénatonium benzoate est ajouté à la formulation pour rendre le produit extrêmement amer et donc éviter l'ingestion de la part des enfants ; la concentration du dénatonium benzoate dans le produit, par contre, est telle que sa présence n'est pas perçue par les rongeurs ciblés.

Les blocs sont perforés et ça permet de les accrocher dans les postes d'appâtage ; les bords des blocs sont gravés pour faciliter la morsure des rongeurs.

Espèces qui peuvent être contrôlées :

MEGALON BLOCS est accepté par tous les rongeurs nuisibles normalement présents dans nos environnements : le rat gris (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le souris (*Mus musculus*).

Caractéristiques :

Le bromadiolone appartient au groupe des anticoagulants indirects de deuxième génération et il est marqué par une toxicité assez élevée vers les rongeurs.

Il est efficace quelle que soit la durée de la consommation des appâts. Selon la littérature,

entre le 90 % et le 100 % des rats nourris pendant 1, 2 ou 4 jours avec des appâts contenant 0.005 % de bromadiolone, meurent. En plus, ils meurent quelle que soit la quantité de bromadiolone ingérée. Une autre caractéristique du bromadiolone c'est que normalement il est bien accepté par le palais des rongeurs.

Taux et indications d'emploi :

Ne pas manipuler le produit aux mains nues. Porter des gants adéquats. Placer les appâts dans des postes d'appâtage de sécurité pour protéger les appâts, pour éviter que les animaux non ciblés les avalent et pour éviter la libération des appâts dans l'environnement. Placer les postes d'appâtage tout près des repaires, le long des pistes et là où on a observé la présence de rongeurs. Les postes d'appâtage doivent être placés à 5-10 mètre de distance entre eux.

Les taux d'emploi recommandés sont : Souris : 2 appâts tous les 100 m² / Rat gris: 3-5 appâts tous les 100 m² / Rat noir: 3-5 appâts tous les 100 m²

Il faut signaler la zone traitée et prévenir sur le risque d'empoisonnement et les mesures de premier secours. Remplacer les postes d'appâtage chaque semaine, si nécessaire. Enlever les rongeurs morts tous les jours et les éliminer selon les normes en vigueur. Le produit n'est pas destiné à l'appâtage permanent. Organiser des traitements de la durée de 6 semaines maximum. A la fin du traitement, éliminer les postes d'appâtage selon les normes en vigueur.

Précautions d'emploi :

Les postes d'appâtage doivent être placés en sécurité afin de réduire au maximum le risque d'intrusion et l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des animaux non ciblés. S'assurer que les postes d'appâtage soient correctement accrochés et que les appâts ne puissent pas être traînés par les rongeurs.

Pour l'utilisation correcte de ce produit, suivre les indications sur l'étiquette. Lire et garder la FDS. Ne pas contaminer les personnes, les animaux, les denrées alimentaires, y compris celles pour animaux, les boissons et leurs récipients avec le produit.

Antidote : Vitamine K1

RODEXION PELLET

RODENTICIDE A BASE DE BROMADIOLONE



MADE IN ITALY



Composition :

Bromadiolone : 0.005 %
Substances attractives : jusqu'à 100 %
et amérisant

Propriétés du produit :

RODEXION pellet est un appât raticide/souricide prêt à l'emploi sous forme de pellet contenant des matières alimentaires attractives. Cette formulation a été spécialement mise au point pour la dératisation des lieux humides : les égouts, caves... L'ingestion d'une seule dose est suffisante à provoquer la mort des rongeurs en peu de jours. Ils meurent sans souffrance et, donc, sans éveiller la méfiance de leurs congénères ; après l'ingestion, les rongeurs se sentent progressivement pris d'un sens d'étouffement donc ils vont chercher l'air et souvent vont mourir à l'extérieur.

Toxicité de la matière active :

DL50 aiguë orale rat : 1.25 mg/ kg
DL50 aiguë orale souris : 1.75 mg/ kg
DL50 aiguë orale chien : >10 mg/ kg
DL50 aiguë orale caille : 1600 mg/ kg
DL50 aiguë orale chat : > 25 mg/ kg
DL50 aiguë orale lapin : 1 mg/ kg
DL50 aiguë cutanée lapin : 2.1 mg/ kg

Technique d'application et dosage :

Faire de petits tas de RODEXION pellet et les placer dans des boîtes à appâts, les égouts ou dans des lieux abrités même humides, où les rats et les souris se trouvent normalement, le long des murs, tout près de leurs terriers, dans les coins et sous les piles de matériels. Vérifier les appâts tous les 2- 3 jours et en ajouter ou renouveler s'il est nécessaire. Les rats et les souris morts doivent être brûlés ou enterrés.

Précautions de manipulation et stockage :

Ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux. Ne pas contaminer les aliments, les boissons et leurs récipients avec le produit. Utiliser des gants pendant l'application du produit. Dans les lieux fréquentés par des enfants ou animaux domestiques, cacher les appâts. Après les traitements, détruire les appâts ou les garder dans un lieu sûr. Après la manipulation et en cas de contamination, se laver soigneusement à l'eau et savon.

Antidote : Vitamine K

NOCURAT PÂTE FRAICHE

Rodenticide a base de difénacoum
moins toxique pour chat et chien



MADE IN ITALY



Composition :

Difénacoum pure	: 0.005 %
Dénatonium Benzoate	: 0.001 %
Substances d'appétence et coformulants	: jusqu'à 100 %

Formulation :

Dans le NOCURAT PATE la matière active difénacoum est formulée en appâts de pâte fraîche (avec un poids d'environ 20 grammes) obtenus mélangeant des farines, du sucre, des huiles végétales, des protéines et des conservateurs. Le dénatonium benzoate est ajouté à la formulation pour rendre le produit extrêmement amer et donc éviter l'ingestion de la part des enfants ; la concentration du dénatonium benzoate dans le produit, par contre, est telle que sa présence n'est pas perçue par les rongeurs ciblés.

La formulation en pâte fraîche est extrêmement appétente pour les rongeurs car il s'agit d'un aliment équilibré contenant toutes les substances alimentaires nécessaires pour leurs croissance (hydrates de carbone, protéines, graisses), par conséquent le NOCURAT PATE est indiqué pour le contrôle des rongeurs dans des environnements variés même en présence de sources d'aliments en concurrence.

Originalité :

La pâte fraîche fabriquée par INDIA est très attractive contient : farine, huile, vanille, chocolat, fromage, fenouil avec des conservateurs.

Pour éviter l'ingestion accidentelle chez les enfants, cette pâte contient un amérissant.

Espèces qui peuvent être contrôlées :

NOCURAT PATE est accepté par tous les rongeurs nuisibles normalement présents dans nos environnements : le rat gris (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le souris (*Mus musculus*)

Caractéristiques :

Le difénacoum appartient au groupe des anticoagulants indirects de deuxième génération

et il est marqué, par rapport au bromadiolone et au brodifacoum, par une toxicité modérée vers les animaux non ciblés comme par exemple les chats et les chiens. Cette particularité le rend particulièrement indiqué pour la dératisation des zones urbaines.

Taux et indications d'emploi :

Ne pas manipuler le produit aux mains nues. Porter des gants adéquats. Placer les appâts dans des postes d'appâtage de sécurité pour protéger les appâts, pour éviter que les animaux non ciblés les avalent et pour éviter la libération des appâts dans l'environnement. Placer les postes d'appâtage tout près des repaires, le long des pistes et là où on a observé la présence de rongeurs. Les postes d'appâtage doivent être placés à 5-10 mètre de distance entre eux.

Les taux d'emploi recommandés sont :

Souris: 2 appâts tous les 100 mètres carrés
Rat gris: 3-5 appâts tous les 100 mètres carrés
Rat noir: 3-5 appâts tous les 100 mètres carrés

Il faut signaler la zone traitée et prévenir sur le risque d'empoisonnement et les mesures de premier secours. Remplacer les postes d'appâtage chaque semaine, si nécessaire. Enlever les rongeurs morts tous les jours et les éliminer selon les normes en vigueur. Le produit n'est pas destiné à l'appâtage permanent. Organiser des traitements de la durée de 6 semaines maximum. A la fin du traitement, éliminer les postes d'appâtage selon les normes en vigueur.

Précautions d'emploi :

Les postes d'appâtage doivent être placés en sécurité afin de réduire au maximum le risque d'intrusion et l'ingestion accidentelle de la part des enfants et des animaux non ciblés. S'assurer que les postes d'appâtage soient correctement accrochés et que les appâts ne puissent pas être traînés par les rongeurs.

Pour l'utilisation correcte de ce produit, suivre les indications sur l'étiquette. Lire et garder la FDS. Ne pas contaminer les personnes, les animaux, les denrées alimentaire, y compris celles pour animaux, les boissons et leurs récipients avec le produit.

Antidote : Vitamine K1

RODIMUR PELLET

Rodenticide à base de difénacoum
moins toxique pour chat et chien



MADE IN ITALY



Composition :

Difénacoum	: 0.005 %
Substances appétantes	: jusqu'à 100 %

Propriétés du produit :

Le difénacoum présente une DL 50 assez élevée pour chien et chat (chien DL50 de 50 mg/kg et chat 100 mg/kg) à titre indicatif le brodifacoum présente une DL 50 de 0.25 mg/kg pour chien et 25 pour chat. Le difénacoum est moins toxique pour chat et chien que le brodifacoum.

Recommandations pour l'utilisation :

Le RODIMUR pellet est un appât rodenticide contenant 0.005 % de difénacoum, qui appartient à la dernière génération des substances anticoagulantes indirectes et qui est très efficace. La matière active est répartie dans toute la masse du pellet.

L'ingestion d'une seule dose de RODIMUR pellet est suffisante à causer la mort du rongeur en peu de jours. Les rongeurs meurent sans souffrance et, donc, sans éveiller les soupçons de leurs semblables; après l'ingestion, les rongeurs se sentent progressivement pris d'un sens d'étouffement. Ils vont donc chercher l'air et vont mourir à l'extérieur.

Technique d'application et dosage :

Toxicité de la matière active :

DL50 aigüe orale rat	: 1.80 mg/ kg
DL50 aigüe orale souris	: 0.80 mg/ kg
DL50 aigüe orale chien	: 50 mg/ kg
DL50 aigüe orale poulet	: 50 mg/ kg

DL50 aigüe orale cochon : 50 mg/ kg

DL50 aigüe orale mouton : 100 mg/ kg

DL50 aigüe orale chat : 100 mg/ kg

DL50 aigüe orale espèce bovine : 150 mg/kg

Mode d'emploi :

Les appâts de Rodimur (20 à 30 g) doivent être placés dans les lieux envahis par les rongeurs, le long de leurs pistes, le long des murs, dans les coins etc. Il faut vérifier les appâts tous les 2 – 3 jours et les renouveler en cas de consommation.

Précautions de manipulation et stockage :

Ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux. Ne pas contaminer les aliments, les boissons et leurs récipients avec le produit. Utiliser des gants pendant l'application du produit. Après les traitements, détruire les appâts ou les garder dans un lieu sûr.

Antidote : Vitamine K

STUNT

Poudre de piste
à base de Coumatetralyl



**KUKBO SCIENCE
CO., LTD.**

MADE IN SOUTH KOREA



Formulation :

Coumatetralyl 0.75%

Utilisation :

Saupoudrez STUNT tout au long des terriers. Au passage des rongeurs la poudre adhère à sa fourrure et le gratte. Le rongeur est dans l'obligation de lécher sa fourrure et par conséquent ingère le produit poison.

Organismes cibles :

Rats et souris.

Stabilité et conditions de stockage :

A conserver dans l'emballage d'origine à la température ambiante.

Mode d'action :

Rodenticide anticoagulant.

Site de traitement :

Champs, caves, abattoirs, dépôts de marchandises, décharges, égouts, fermes, vergers...

Informations de sécurité :

En cas d'ingestion de raticides, dans la mesure du possible, prendre l'emballage du produit pour le montrer au médecin.

Symptômes d'intoxication : État de choc, saignement de nez, vomissements sanglants, douleurs abdominales, maux de dos.

Traitement : Aide élémentaire, décontamination et traitement symptomatique.

Antidote : Vitamine K1

Dans les cas graves, l'administration de facteurs de coagulation ou de plasma, voire une transfusion sanguine peut être nécessaire.

En cas d'ingestion, irriguer l'estomac en utilisant en plus du charbon actif.

Demander un avis médical urgent ou consulter le médecin immédiatement.